

Especificação de Vacinas contra COVID-19 recebidas em Jacundá

| Fabricante | Sinovac/Butantan | AstraZeneca/Fiocruz |
|---|---|---|
| Plataforma | Vírus inativado | Vacina covid-19 (recombinante) |
| Indicação de uso | Maior ou igual à 18 anos | Maior ou igual a 18 anos |
| Apresentação | Frascos-ampola, multidose 10 doses | Frascos-ampola com 5,0 mL (10 ou 5 doses) cada. |
| Via de administração | IM (intramuscular) | IM (intramuscular) |
| Esquema vacinal/intervalos | 2 doses de 0,5 ml, intervalo entre doses de 2 à 4 semanas. Recomenda-se aprazamento de 4 semanas em virtude da disponibilização de doses. | 2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 12 semanas. |
| Composição por dose | 0,5 ml com 600SU de antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 | 0,5 mL contém 1×10^{11} partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike(S). |
| Validade após abertura do frasco | 8 horas após abertura em temperatura de 2°C a 8°C | 6 horas após aberta sob refrigeração (2°C a 8°C) |
| Eficácia | Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados. Eficiente contra a variante do Brasil. | Mostrou resultados em $\geq 98\%$ dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e $> 99\%$ em 28 dias após a segunda dose. Eficácia: 79% na prevenção da Covid-19 sintomático e 100% de eficácia na prevenção de doenças graves e hospitalização, após a segunda dose. Em idosos com 65 anos ou mais, novo estudo aponta índice de 85% de eficácia. Eficiente contra a variante do Brasil. |